

AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

| 栄養素 | 単位 | AAFCO 幼犬用基準 | AAFCO 成犬用基準 | マイリトル ダーリン | メンテナンス/ スモール [ラム] | メンテナンス スモール [ターキー] | メンテナンス スモール [フィッシュ] | シューブ リーム | シニア サポート | レジーム/ スモール |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ●タンパク | % | 22.5以上 | 18.0以上 | 37.0 | 19.8 | 26.0 | 19.0 | 28.8 | 31.8 | 29.1 |
| アルギニン | % | 1.0以上 | 0.51以上 | 2.37 | 1.36 | 1.52 | 1.12 | 1.87 | 2.07 | 1.83 |
| ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 | 0.85 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.61 | 0.68 | 0.72 |
| イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 | 1.65 | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 1.11 | 1.20 | 1.15 |
| ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 | 3.02 | 1.39 | 1.69 | 1.69 | 2.01 | 2.16 | 2.12 |
| リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 | 2.61 | 1.01 | 1.61 | 1.04 | 1.72 | 2.02 | 1.89 |
| メチオニン | % | 0.35以上 | 0.33以上 | 0.69 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.59 | 0.78 | 0.65 |
| メチオニン+シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 | 1.08 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.91 | 1.05 | 1.06 |
| フェニルアラニン | % | 0.83以上 | 0.45以上 | 1.73 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 1.15 | 1.23 | 1.29 |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 | 3.04 | 1.41 | 1.64 | 1.55 | 1.97 | 2.09 | 2.01 |
| トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 | 1.67 | 0.75 | 1.04 | 0.76 | 1.12 | 1.22 | 1.22 |
| トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 | 0.39 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 | 1.98 | 0.97 | 1.22 | 0.96 | 1.35 | 1.46 | 1.48 |
| ●脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 | 14.4 | 9.5 | 11.7 | 11.4 | 16.5 | 11.2 | 7.1 |
| リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 1.2 |
| α-リノレン酸 | % | 0.08以上 | - | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.60 | 0.17 | 0.17 |
| EPA+DHA | % | 0.05以上 | - | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.06 | 0.60 | 0.20 |
| リノール酸+アラキドン酸 :αリノレン酸+EPA+DHA | | 30:1 | 30:1 | 3.6:1 | 2.2:1 | 4.2:1 | 2:1 | 4.8:1 | 1.8:1 | 3.3:1 |
| ●ミネラル | | | | | | | | | | |
| カルシウム | % | 1.2~1.8 | 0.5~1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
| リン | % | 1.0~1.6 | 0.4~1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| カルシウム : リンの比率 | | 1:1~2:1 | 1:1~2:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.3:1 | 1.8:1 | 1.2:1 | 1.3:1 | 1.3:1 |
| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.75 |
| 塩化物 | % | 0.45以上 | 0.12以上 | 0.85 | 0.57 | 0.87 | 0.67 | 0.49 | 0.46 | 1.20 |
| マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.15 |
| 鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 | 147 | 265 | 267 | 226 | 202 | 250 | 290 |
| 銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 | 15.8 | 23.8 | 24.6 | 25.0 | 22.2 | 13.6 | 17.5 |
| マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 | 8.0 | 51.2 | 31.0 | 42.0 | 30.7 | 77.2 | 40.8 |
| 亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 | 349 | 404 | 195 | 193 | 153 | 239 | 215 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.0~11 | 1.0~11 | 2.0 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 3.6 |
| セレン | mg/kg | 0.35~2 | 0.35~2 | 0.40 | 0.36 | 0.56 | 0.53 | 0.91 | 1.03 | 0.67 |
| ●ビタミン・その他 | | | | | | | | | | |
| ビタミンA | IU/kg | 5000~250000 | 5000~250000 | 10849 | 17842 | 20236 | 20783 | 20163 | 22632 | 21075 |
| ビタミンD | IU/kg | 500~3000 | 500~3000 | 2423 | 1603 | 2163 | 2945 | 1142 | 1429 | 1581 |
| ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 | 69 | 321 | 221 | 248 | 211 | 219 | 309 |
| チアミン(B1) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 | 3.20 | 7.70 | 30.00 | 34.80 | 30.13 | 6.50 | 33.09 |
| リボフラビン(B2) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 | 5.8 | 5.7 | 12.1 | 8.0 | 13.3 | 8.5 | 10.9 |
| パントテン酸(B5) | mg/kg | 12以上 | 12以上 | 12 | 28 | 26 | 19 | 27 | 18 | 36 |
| ナイアシン(B3) | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 | 70.6 | 72.0 | 156.3 | 145.8 | 196.6 | 99.8 | 167.5 |
| ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 | 7.1 | 5.9 | 13.7 | 10.9 | 17.4 | 11.2 | 10.1 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 | 0.580 | 1.500 | 3.670 | 2.620 | 2.770 | 0.830 | 1.686 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 | 0.039 | 0.128 | 0.120 | 0.051 | 0.100 | 0.103 | 0.072 |
| コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 | 2500 | 2024 | 1713 | 1523 | 1765 | 2336 | 1686 |

ご注意

①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。*乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。

②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。

AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

| 栄養素 | 単位 | AAFCO 幼犬用基準 | AAFCO 成犬用基準 | フラックス | キドニア | おなかに やさしいフード |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|-----------------|
| ●タンパク | % | 22.5以上 | 18.0以上 | 26.0 | 31.8 | 25.0 |
| アルギニン | % | 1.0以上 | 0.51以上 | 1.59 | 2.07 | 1.6 |
| ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 | 0.53 | 0.68 | 0.7 |
| イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 | 0.90 | 1.20 | 1.2 |
| ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 | 1.82 | 2.16 | 2.0 |
| リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 | 1.26 | 2.02 | 1.9 |
| メチオニン | % | 0.35以上 | 0.33以上 | 0.69 | 0.78 | 0.6 |
| メチオニン+シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 | 1.02 | 1.05 | 0.8 |
| フェニルアラニン | % | 0.83以上 | 0.45以上 | 1.04 | 1.23 | 1.2 |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 | 1.65 | 2.09 | 2.0 |
| トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 | 1.03 | 1.22 | 1.2 |
| トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 | 0.26 | 0.29 | 0.3 |
| バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 | 1.20 | 1.46 | 1.4 |
| ●脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 | 12.1 | 11.2 | 9.1 |
| リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 | 2.0 | 1.5 | 2.6 |
| α-リノレン酸 | % | 0.08以上 | - | 0.29 | 0.17 | 0.5 |
| EPA+DHA | % | 0.05以上 | - | 0.28 | 0.60 | 0.2 |
| リノール酸+アラキドン酸 :αリノレン酸+EPA+DHA | | 30:1 | 30:1 | 3.5 : 1 | 1.8 : 1 | 3.7 : 1 |
| ●ミネラル | | | | | | |
| カルシウム | % | 1.2~1.8 | 0.5~1.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
| リン | % | 1.0~1.6 | 0.4~1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
| カルシウム : リンの比率 | | 1:1~2:1 | 1:1~2:1 | 1.6:1 | 1.3 : 1 | 1.1 : 1 |
| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 | 0.81 | 0.39 | 0.61 |
| 塩化物 | % | 0.45以上 | 0.12以上 | 1.43 | 0.46 | 1.32 |
| マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 | 0.08 | 0.21 | 0.10 |
| 鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 | 123 | 250 | 461 |
| 銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 | 16.6 | 13.6 | 27 |
| マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 | 22.0 | 77.2 | 18.6 |
| 亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 | 148 | 239 | 164 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.0~11 | 1.0~11 | 2.2 | 1.8 | 7.5 |
| セレン | mg/kg | 0.35~2 | 0.35~2 | 0.59 | 1.03 | 0.55 |
| ●ビタミン・その他 | | | | | | |
| ビタミンA | IU/kg | 5000~250000 | 5000~250000 | 12746 | 22632 | 22917 |
| ビタミンD | IU/kg | 500~3000 | 500~3000 | 1917 | 1429 | 570 |
| ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 | 281 | 219 | 124 |
| チアミン(B1) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 | 10.40 | 6.50 | 6.25 |
| リボフラビン(B2) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 | 10.1 | 8.5 | 11.0 |
| パントテン酸(B5) | mg/kg | 12以上 | 12以上 | 18 | 18 | 64 |
| ナイアシン(B3) | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 | 137.8 | 99.8 | 153.5 |
| ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 | 14.4 | 11.2 | 13.2 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 | 1.540 | 0.830 | 2.193 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 | 0.090 | 0.103 | 0.044 |
| コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 | 1426 | 2336 | 2012 |

ご注意

①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。*乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。

②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。